

## Agachadiza común

*Gallinago gallinago*



### FENOLOGÍA

Las primeras llegan pronto, aunque no es hasta octubre cuando se ven con facilidad. Permanecen hasta marzo o abril, con algunos ejemplares rezagados hasta mayo.

### DISTRIBUCIÓN

Aunque en términos absolutos es escasa, aparece bien distribuida por los humedales de todo el territorio. A veces se dan concentraciones numerosas, como ocurre en invierno en el río Guadalquivir por El Salto.

### COMENTARIOS

Se alimenta introduciendo su largo pico (el cual le vale el nombre vernáculo de pitorra) en el suelo, de ahí que necesite de suelos blandos para buscar comida.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
<b>H-2</b>	<b>SE-2</b>	<b>CO-2</b>	J-2
<b>H-3</b>	SE-3	<b>CO-3</b>	<b>J-3</b>
H-4	<b>SE-4</b>	CO-4	<b>J-4</b>
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	<b>SE-6</b>	CO-6	J-6
H-7	SE-7	<b>CO-7</b>	J-7
<b>H-8</b>	SE-8	CO-8	<b>J-8</b>
<b>H-9</b>	<b>SE-9</b>	CO-9	<b>J-9</b>
H-10	<b>SE-10</b>	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	<b>CO-12</b>	J-12
<b>H-13</b>	<b>SE-13</b>	CO-13	<b>J-13</b>
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	<b>SE-15</b>	<b>CO-15</b>	<b>J-15</b>
H-16			
<b>H-17</b>			

### ESTATUS

Invernante y migrante.

### POBLACIÓN

Poco común.

### HÁBITAT

Márgenes limosos y playitas de barro en todo tipo de cauces fluviales, prados encharcados, orillas de embalses, charcas, y en general cualquier humedal o aguazal con orillas despejadas y de sustrato blando.