


Águila pescadora

Pandion haliaetus



FENOLOGÍA

Llega en septiembre (a veces algo antes) y se marcha en marzo-abril. Algunos individuos permanecen gran parte del verano.

DISTRIBUCIÓN

Escasa pero regular en pantanos de casi todo el territorio. En Jaén es rara, viéndose regularmente en el embalse del Yeguas. En Córdoba se cibe normalmente a los embalses del Arenoso y de Puente Nuevo. En Sevilla se ve sobre todo en José Torán, Melonares y El Pintado. En Huelva aparece en el embalse de Zufre y en número algo mayor en el de Aracena. De modo ocasional recala en otros humedales. Las localidades que concentran mayor número de citas de ejemplares veraneantes son los pantanos de Aracena y José Torán.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
VU	VU	CR	FE

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Invernante y migrante, con algunas aves veraneantes no reproductoras.

POBLACIÓN

Escasa, pudiéndose estimar unos 810 ejemplares cada invierno.

HÁBITAT

Restringida a los grandes y medianos embalses. En migración se llegan a ver pescadoras en vuelo por casi cualquier parte de la Sierra.