Alcaudón real

Lanius meridionalis

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	NT	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	**CO-1**	**J-1**
H-2	**SE-2**	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	**J-3**
H-4	**SE-4**	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	**CO-8**	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	**SE-10**	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	**SE-12**	CO-12	**J-12**
H-13	SE-13	CO-13	**J-13**
H-14	**SE-14**	CO-14	J-14
H-15	SE-15	**CO-15**	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario e invernante.

POBLACIÓN

Poco común.

HÁBITAT

Asociado a zonas de matorral y arbolado disperso (pastizales, retamares, campiñas con linderos, monte mediterráneo poco denso, dehesas abiertas, pseudoestepas, etc.).

FENOLOGÍA

Se puede ver todo el año, si bien en invierno aumentan sus números con la llegada de aves foráneas.

DISTRIBUCIÓN

Aparece por toda Sierra Morena, excepto en las áreas boscosas más cerradas. En promedio, resulta más escaso en Huelva.