


Alimoche común

Neophron percnopterus



FENOLOGÍA

La mayor parte de citas de migrantes se concentran en marzo-abril y en agosto-septiembre. Las aves territoriales permanecen entre ambos períodos migratorios.

DISTRIBUCIÓN

La única pareja que queda está en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Muy cerca del límite septentrional de Sierra Morena Cordobesa, pero fuera de nuestra área de estudio, hay otra pareja que suele alimentarse en las dehesas de Espiel y Villanueva del Rey. En paso puede avistarse en cualquier sector de Sierra Morena.

COMENTARIOS

Hay registros de aves adultas en época de cría (territorios posibles) en Hornachuelos, Sierra Morena Sevillana, oeste de Huelva y Sierra Morena de Jaén.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
VU	EN	EN	CR

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante y reproductor estival.

POBLACIÓN

Es una de las aves más raras en la Sierra, pues sólo queda una pareja reproductora, a lo que habría que sumarle otros tres territorios posibles. En paso es escaso.

HÁBITAT

Como reproductor elige cañones y cortados rocosos. En paso se registran tanto aves en vuelo como ejemplares que toman tierra para alimentarse en áreas despejadas (pastizales, dehesas, pseudoestepas).