


Ánade azulón

Anas platyrhynchos



FENOLOGÍA

Se ve todo el año. Fuera de la época de cría forma agrupaciones en humedales de cierta entidad.

DISTRIBUCIÓN

Tiene una distribución homogénea por toda la cordillera.

COMENTARIOS

Como dato de los movimientos que hace la especie, está registrado el caso de una hembra anillada en Doñana en junio de 1988 que fue cazada en septiembre del año siguiente en Villanueva de la Reina.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario, con aporte débil de aves foráneas.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Es la única anátida habitual en ríos y arroyos de las sierras. También aparece en embalses, pantanetas, charcas y balsas.