


Andarríos chico

Actitis hypoleucos



FENOLOGÍA

Al igual que la especie anterior, llega muy pronto, se marcha tarde y presenta migraciones muy alargadas en el tiempo. Esto, unido a la presencia de aves en plena primavera y verano, hace que contemos con citas en todos los meses del año.

DISTRIBUCIÓN

Repartido por todo el territorio.

COMENTARIOS

Tenemos una cita de dos aves en actitud "sospechosa" de cría en el río Sotillo (límite entre Sevilla y Badajoz) en mayo de 2009, si bien no se pudo comprobar su reproducción. Sí ha criado en ríos y embalses del sur de la provincia de Huelva en los últimos años.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante e invernante, con algunas aves estivales no reproductoras.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Más asociado a orillas de grandes embalses que el andarríos grande, aunque también se le ve en ríos de lecho rocoso.