


Ansar común

Anser anser



FENOLOGÍA

Aparte de en fechas de paso, con menor regularidad se ven bandos volando en plena invernada, especialmente en años secos en los que los ánsares se ven abocados a moverse entre distintos humedales peninsulares.

DISTRIBUCIÓN

Es más fácil de detectar en Huelva y Sevilla, siendo menos frecuente en la parte oriental. En Sierra Morena Sevillana (embalse del Huesna) se ven grupos de ánsares todo el año, asentados e intentando criar al menos desde 2001; el origen de dichas aves es desconocido, pero consideramos dudosa su procedencia salvaje, habida cuenta de la existencia de gansos domésticos de variado fenotipo en el lugar. Hay también avistamientos en el embalse de Melonares, que posiblemente estén relacionados con la mencionada y cercana población del Huesna.

COMENTARIOS

El hecho de que sea más fácil ver gansos cruzando los cielos del oeste de la Sierra se debe a que la mayor parte de la población europea inverna habitualmente en Doñana, y para llegar hasta allí han de sobrevolar Sierra Morena occidental.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante, con algunas aves invernantes.

POBLACIÓN

Común en los pasos de otoño y primavera.

HÁBITAT

Suele verse casi exclusivamente en los cielos de nuestro territorio. No obstante, a veces se avista en embalses.