


Avión zapador

Riparia riparia



FENOLOGÍA

La migración de primavera va de marzo a mayo, y la postnupcial de julio a octubre. Los meses en los que suele verse con más regularidad son marzo y agosto.

DISTRIBUCIÓN

El único punto de reproducción conocido en la mitad occidental es la riera de Alcalabozza, en Rosal de la Frontera. En el levante de la Comarca hay colonias en el valle del Guadalquivir, entre Córdoba y Jaén.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	DD

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante y estival.

POBLACIÓN

Escaso como migrante, muy raro como reproductor.

HÁBITAT

En migración se ven bandos en vuelo, que no llegan a asentarse en tierra. Cría en taludes arenosos de la orilla de ríos.