


Búho chio

Asio otus



FENOLOGÍA

Desconocida. La mejor época para detectarlo es el mes de mayo, cuando vuelan los pollos.

DISTRIBUCIÓN

En las últimas tres temporadas hemos comprobado su reproducción en los Llanos de Guaditoca, el entorno del Santuario de la Virgen de la Cabeza y en las campiñas a caballo entre Córdoba y Jaén. No obstante, debe estar presente en áreas propicias de las cuatro provincias.

COMENTARIOS

Esta especie nocturna es tan discreta en sus hábitos como en su canto, de ahí la dificultad de su estudio. La mejor manera de detectarla y saber si ha criado es hacer estaciones de escucha en los meses de mayo y junio, cuando los pollos ya han saltado del nido y se mueven por el entorno de este, reclamando con chillidos alimento a sus padres. Conocemos un caso reciente de nidificación en construcción humana (en un nido de cuervo situado en el interior de una torre medieval, en la campiña de Montoro).

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Reproductor que quizá hace movimientos tras la cría. No podemos afirmar que sea sedentario.

POBLACIÓN

Muy escaso en casi toda la región, siendo poco común en determinadas zonas.

HÁBITAT

Encinares y pinares abiertos, manchas de monte con arbolado disperso, campiñas agrícolas y bosquetes aislados. También hay citas en bosques de ribera y parques urbanos. Utiliza nidos viejos de otras aves, especialmente de córvidos.