


Búho real

Bubo bubo



FENOLOGÍA

Permanece en el territorio todo el año, aunque es más fácil de detectar en su época de celo (octubrediciembre).

DISTRIBUCIÓN

Común y bien repartido por las cuatro provincias. Es más escaso en aquellas áreas donde hay poco conejo (de ahí que en Huelva sea menos frecuente que en las demás provincias), y numeroso en localidades en las que abunda el lagomorfo, como el valle del Viar y otras zonas del pie de Sierra Morena Sevillana.

COMENTARIOS

No es raro que anide en el suelo, resguardado entre arbustos, supliendo así la falta de lugares de nidificación óptimos que, de otro modo, limitarían su presencia en muchas zonas de Sierra Morena. Hoy en día hace las veces de superdepredador, cazando incluso otras especies de rapaces diurnas y nocturnas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Especie ecléctica y adaptable, amante de ambientes rupícolas pero que ocupa por igual montes de matorral, barrancos y laderas empinadas, zonas desarboladas, etc. Evita, no obstante, los bosques densos.