


Buitre leonado

Gyps fulvus



FENOLOGÍA

Se ve todo el año, aumentando mucho sus efectivos entre noviembre y febrero. El paso migratorio es más notorio en octubre y noviembre.

DISTRIBUCIÓN

En Sevilla hay varias colonias que suman 106 pp., en Córdoba los territorios se asientan en riscales de la Sierra de Hornachuelos (138 pp.) y en Jaén se cuentan 107 pp. bastante repartidas. No cría en Huelva. No obstante, la población de aves no reproductoras es mucho mayor, y no en vano en invierno llegan a censarse más de 7.000 buitres en Sierra Morena, siendo por tanto una especie fácil de detectar en todas las provincias.

COMENTARIOS

Esta especie aumentó de modo espectacular sus efectivos en la década de los 90, si bien posteriormente se ha estabilizado. A Sierra Morena llegan cada año aves marcadas (de todas las edades, pero especialmente juveniles e inmaduros) procedentes de lugares como Alicante, Castellón o Zaragoza.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario, con aporte de aves invernantes y migrantes.

POBLACIÓN

Abundante. Como reproductor es poco común (más de 350 pp.).

HÁBITAT

Se le ve campeando por todo tipo de zonas, si bien sus áreas de alimentación están en dehesas, pastizales y superficies de monte mediterráneo ricas en alimento (carroñas, tanto de ganado doméstico como de animales salvajes).