


Calandria común

Melanocorypha calandra



FENOLOGÍA

Se ve todo el año. En invierno tiende a formar agrupaciones más numerosas.

DISTRIBUCIÓN

Ausente de Huelva y muy localizada en el resto: en Córdoba ocupa las campiñas del sur de Hornachuelos y Montoro; en Sevilla los llanos esteparios de Guadalcanal y el valle de la rivera de Benalija; y en Jaén aparece en la campiña agrícola y en algunos lugares del pie de la Sierra (por ejemplo, el entorno de Santa Amalia en Andújar).

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario.

POBLACIÓN

Escasa.

HÁBITAT

Paisajes psedoesteparios de pastizales y retamares, llanos desarbolados y cultivos en la campiña.