

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS


Invernante y migrante.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Aunque normalmente se le asocia al bosque de ribera de zonas frescas, no sólo se ve en este tipo de formaciones. Los jarales de jara pringosa, los huertos de frutales y los zarzales también son querenciosos para los camachuelos, que se van moviendo por distintas zonas según dispongan de comida. Tenemos avistamientos incluso en pinares, alcornoques y quejigares.



FENOLOGÍA

La mayoría de ejemplares están entre nosotros de noviembre a marzo, algunos de ellos antes y después de esta horquilla.

DISTRIBUCIÓN

Aparece en las cuatro provincias, si bien parece ser más habitual en Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y en parte de la provincia de Sevilla.

COMENTARIOS

En Sierra Morena se alimenta principalmente de yemas y brotes tiernos de árboles y arbustos, pero también de semillas de jaras y de zarzamoras secas.