


Carricero común

Acrocephalus scirpaceus



FENOLOGÍA

Los pasos van de mediados de marzo a mayo, y de agosto a finales de octubre (a veces, hasta primeros de noviembre). La mayoría de citas de migrantes en Sierra Morena son del paso postnupcial.

DISTRIBUCIÓN

No hay datos de cría en Huelva, y parece que tampoco se reproduce en Sevilla. En Córdoba sí lo hace en el tramo medio del río Guadiato y en el Guadalquivir, y en Jaén en este mismo río y en la desembocadura del Jándula, además de en el pequeño pantano de Zocueca y, probablemente, en el río Rumbiar en su tramo bajo.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante y estival.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Los reproductores habitan orillas de humedales con densa vegetación de eneaes y carrizos, o bien riberas con maraña de vegetación (sauces, fresnos, zarzas, carrizos, adelfas, etc.). En paso se registra en los mismos hábitats, aunque también en riberas arboladas e incluso en matorrales.