


## Cernícalo primilla

*Falco naumanni*



### FENOLOGÍA

Las llegadas tienen lugar a partir de febrero, y los últimos se marchan a principios de octubre. Hay pasos en febreromarzo y julioseptiembre, además de alguna cita invernal (diciembre y enero).

### DISTRIBUCIÓN

No cría en Huelva ni en Córdoba, mientras que en Sevilla sólo queda una colonia (Guadalcanal, 22 pp.). El grueso de sus efectivos está en Jaén, repartido entre las colonias de Villanueva de la Reina (32 pp.), Baños de la Encina (unas 6 pp.) y La Carolina (unas 15 pp.).

### COMENTARIOS

La población actual de La Carolina existe gracias a un proyecto de reintroducción llevado a cabo por SEOJaén y Ecologistas en Acción mediante la técnica de hacking, que ha permitido ver volar de nuevo a los primillas en los cielos de este pueblo jiennense, tras haber desaparecido en 1981.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	VU	NT

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	<b>SE-10</b>	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	<b>J-13</b>
H-14	SE-14	CO-14	<b>J-14</b>
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Escaso (unas 75 pp.).

### HÁBITAT

Todas las colonias se hallan en construcciones humanas, tanto en cascos urbanos como en viejos cortijos en el campo. Requieren de áreas de campiña, cultivos y pastizales para alimentarse.