

Chocha perdiz

Scolopax rusticola



FENOLOGÍA

Se detecta, sobre todo, entre noviembre y marzo.

DISTRIBUCIÓN

Hay pocas citas anuales, y muchas se repiten en las mismas localidades año tras año. La mayor parte de las referencias provienen de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero pensamos que tampoco debe ser rara en Sevilla, Córdoba y Jaén.

COMENTARIOS

Es una especie críptica, huidiza, esquiva y nocturna, y por ello poco conocida, de modo que se tiende a subestimar sus efectivos; no obstante, es escasa, pero no tan rara como pudiera parecer.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Invernante.

POBLACIÓN

Escasa.

HÁBITAT

Ocupa gran variedad de hábitats, siempre que posean refugio y sustrato blando para alimentarse. Normalmente aparece en ríos y arroyos que cuentan con bosque de ribera o sotos de adelfas, zarzas y tamujos; también en monte bajo, pastizales, castañares, alcornoques, dehesas, pinares, eucaliptales y jarales. A veces incluso se levanta de cunetas encharcadas de caminos y carreteras poco transitadas.