


## Chorlitejo chico

*Charadrius dubius*



### FENOLOGÍA

Se ve entre finales de febrero y octubre. No obstante, tenemos alguna cita a mediados de enero, de confusa interpretación.

### DISTRIBUCIÓN

Repartido por todo el territorio, aunque es más numeroso en la mitad occidental (quizá debido a la más favorable red fluvial de Huelva y Sevilla).

### COMENTARIOS

Es el limícola más abundante y mejor repartido como reproductor.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	DD

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	<b>CO-1</b>	J-1
<b>H-2</b>	SE-2	<b>CO-2</b>	J-2
<b>H-3</b>	SE-3	CO-3	J-3
H-4	<b>SE-4</b>	CO-4	<b>J-4</b>
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
<b>H-9</b>	<b>SE-9</b>	CO-9	<b>J-9</b>
<b>H-10</b>	<b>SE-10</b>	CO-10	<b>J-10</b>
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	<b>CO-12</b>	J-12
<b>H-13</b>	SE-13	CO-13	<b>J-13</b>
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	<b>SE-15</b>	CO-15	<b>J-15</b>
H-16			
<b>H-17</b>			

### ESTATUS

Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Poco común.

### HÁBITAT

Ríos con orillas pedregosas y playitas de guijarros, orillas de embalses y algunas charcas.