

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia



FENOLOGÍA

Toman los nidos en noviembre y los abandonan en julio o agosto. Durante el mes de octubre apenas quedan cigüeñas en la Sierra.

DISTRIBUCIÓN

Hay una gran diferencia entre la zona oriental y la occidental de Sierra Morena. Así, en Huelva y Sevilla llega a ser abundante, pudiendo ser calificada de rara en gran parte de Córdoba y Jaén, donde es complicada de ver fuera de ciertos pueblos.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante, con algunas aves en las fechas consideradas como invernada para la especie (quizá quepa hablar de algunos individuos sedentarios en el territorio).

POBLACIÓN

Común, rondando las 200 pp.

HÁBITAT

Anida en campanarios de iglesias y otros edificios de pueblos y aldeas, así como en cortijos y haciendas, aunque también hay colonias en ambientes naturales (en choperas y eucaliptos en las riberas, dehesas de encina, etc.).