


Cigüeña negra

Ciconia nigra



FENOLOGÍA

El grueso llega a partir de mediados de febrero y se marcha en septiembre.

DISTRIBUCIÓN

Bien repartida por todo el territorio, aunque resulta bastante más abundante en Huelva y Sevilla. En invierno se ha registrado en humedales de estas dos provincias.

COMENTARIOS

Es una de las especies más emblemáticas de Sierra Morena, que concentra la totalidad de la población reproductora andaluza. La mayoría de nidos se ubica en alcornoques, aunque las parejas más conocidas y estudiadas son las que anidan en roca.

AMENAZAS

En nuestro territorio los problemas y amenazas vienen dados tanto por factores naturales (sequías, lluvias intensas, caídas de nidos, etc.) como por las molestias derivadas de trabajos forestales (que, no obstante, tienden a compatibilizarse con la presencia de nidos) y, en ciertos lugares, del tránsito de personas y de ganado caprino.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
VU	EN	VU	EN

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival reproductor, migrante y en menor medida invernante.

POBLACIÓN

Las 65-80 pp. existentes hacen que pueda calificarse como común. Como invernante es rara, aunque aparentemente regular.

HÁBITAT

Se alimenta en riveras, charcas y embalses, pero anida en cortados rocosos y bosques. Los grupos migratorios suelen asentarse en pozas de cauces fluviales y colas de embalses. En invierno se avista en algunos ríos y pantanos.