

Codorniz común

Coturnix coturnix



FENOLOGÍA

El grueso llega en marzo y se marcha en agostoseptiembre, aunque hay avistamientos en todos los meses del año.

DISTRIBUCIÓN

Es más frecuente en las áreas de campiña del valle del Guadalquivir, si bien no es complicada de encontrar en ninguna de las cuatro provincias. En invierno ha sido detectada en Huelva y Córdoba.

AMENAZAS

Es una de las especies más afectadas por el abandono del campo en Sierra Morena. Antaño, cuando se sembraban pequeñas parcelas diseminadas por valles y cerros, era numerosa y estaba mejor distribuida.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	DD	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival, con algunas citas invernales.

POBLACIÓN

En términos generales es escasa, si bien hay áreas donde llega a ser relativamente numerosa.

HÁBITAT

Pastizales, herbazales y cultivos. A veces en claros de bosques, dehesas y cabezos montanos.