

Colirrojo real

Phoenicurus phoenicurus



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
VU	VU	VU	VU

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS


Migrante y estival.

POBLACIÓN

Escaso en la mayor parte del territorio.

HÁBITAT

Para criar necesita bosques maduros y frescos, con árboles viejos que abunden en huecos y agujeros (castañares, alcornoques, robledales); no obstante, también hay núcleos asentados en pinares, olivares y huertos de frutales, y casos de cría en pequeños rodales de arbolado exótico. En paso se ve tanto en ambientes forestales, como en espacios abiertos.



FENOLOGÍA

Los reproductores llegan a primeros de abril y se marchan en septiembre, en términos generales. A los migrantes es más fácil detectarlos en el paso postnupcial.

DISTRIBUCIÓN

Mucho más numeroso y mejor distribuido en Huelva (donde en determinadas áreas de la Sierra de Aracena y Tentudía onubense llega a ser localmente abundante) que en el resto. En Jaén cría en robledales de Sierra Quintana (límite con Ciudad Real) y posiblemente en algunos lugares de Despeñaperros. En Córdoba se cría en pinares del municipio de Villaviciosa de Córdoba, donde aprovecha el castaño de modo significativo. En Sevilla, a pesar de haber bosques mediterráneos óptimos para la especie, sólo lo hemos encontrado en algunos pinares de Almadén de la Plata.

COMENTARIOS

Las presentes citas de cría de Jaén son los primeros datos publicados de reproducción en Sierra Morena oriental. La principal población de Andalucía es la de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.