


Cormorán grande

Phalacrocorax carbo



FENOLOGÍA

Se le puede ver todo el año, con máximos en los pasos migratorios (septiembre y marzo) y buenos números durante la invernada.

DISTRIBUCIÓN

Aparece en todos los embalses de Sierra Morena, aunque es más abundante en los tramos represados del río Guadalquivir, el embalse de Melonares y el de Aracena. Precisamente en este último estableció una colonia reproductora en 2010, siendo una de las pocas localidades de Andalucía donde cría por el momento; allí se contabilizaron al menos 6 parejas en 2010 y 24 parejas en 2011.

COMENTARIOS

Esta ave, desconocida para los serranos de mayor edad, es una de las especies beneficiadas por la construcción de embalses; actualmente se halla en clara expansión (las primeras citas en Sierra Morena Sevillana, por ejemplo, son de 1986) y aumento, tanto en nuestro territorio como en el contexto europeo. Hay algunos datos de aves anilladas, como un ejemplar marcado como pollo en Dinamarca en 2001 y que invernó en el río Jándula en 2004 y 2005, o un ave alemana hallada muerta en 1994 en una pantaneta de Cazalla de la Sierra.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Invernante y migrante, reproductor en alguna localidad y con aves veraneantes no reproductoras.

POBLACIÓN

Común. Como reproductor es raro (unas 30 pp.).

HÁBITAT

Embalses, ríos, charcas, pantanetas agropecuarias y tramos anchos de ríos.