

Críalo europeo

Clamator glandarius




CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			



FENOLOGÍA

Es uno de los migrantes transaharianos más tempranos en llegar, siendo posible ver alguno a partir de diciembre (aunque generalmente llegan en febrero); se marchan pronto, los adultos dejan de avistarse ya en mayojunio, aunque hay jóvenes que se quedan hasta septiembre.

DISTRIBUCIÓN

En Huelva es extremadamente escaso, apenas se le ve en algunos lugares de Encinasola, donde posiblemente se reproduce. En el resto de provincias aparece a parches, de modo que en Sevilla está presente por ejemplo en las pseudoestepas de Guadalcanal y los montes de la cuenca de la rivera de Onza; en Córdoba se le ve en el norte de la Sierra de Hornachuelos, las dehesas de Espiel o los pinares de Villaviciosa de Córdoba; mientras que en Jaén es relativamente numeroso en el valle del Jándula.

COMENTARIOS

Su distribución está dentro del rango de la propia de la urraca, su principal especie hospedadora. Y es que el críalo, al igual que el cuco, es una especie parásita que deposita sus huevos en nidos de otras aves, sobre todo de córvidos y muy especialmente de urracas.

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Escaso, aunque en algunos lugares llega a ser común.

HÁBITAT

Ligado al monte mediterráneo, suele aparecer en paisajes de matorral con arbolado disperso (sobre todo, pinos), aunque también los hay en retamares, pastizales, claros en pinares, etc.