


Cuchara común

Anas clypeata



FENOLOGÍA

Se ve, sobre todo, entre octubre y marzo.

DISTRIBUCIÓN

En Huelva es muy raro, registrándose ocasionalmente en el embalse de Aracena. En Sevilla su mejor localidad es el embalse de Melonares. En Córdoba inverna en el Guadalquivir (El Salto), el embalse de Puente Nuevo y, a veces, en otros humedales. En Jaén se cita sobre todo en el embalse de Marmolejo y el pantano del Yeguas, aunque también recalca en balsas y pantanetas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	NT	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Invernante y migrante.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Embalses.