


## Curruca rabilarga

*Sylvia undata*



### FENOLOGÍA

Permanece todo el año. Es posible que en invierno se produzcan desplazamientos de poca magnitud.

### DISTRIBUCIÓN

La detectaremos por toda Sierra Morena, aunque repartida por núcleos en función de la disponibilidad de hábitat.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	<b>CO-1</b>	<b>J-1</b>
<b>H-2</b>	<b>SE-2</b>	CO-2	J-2
<b>H-3</b>	<b>SE-3</b>	CO-3	J-3
H-4	SE-4	<b>CO-4</b>	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	<b>J-7</b>
H-8	SE-8	CO-8	<b>J-8</b>
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	<b>CO-10</b>	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	<b>SE-12</b>	CO-12	<b>J-12</b>
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	<b>SE-14</b>	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Sedentaria.

### POBLACIÓN

Común.

### HÁBITAT

Estrictamente asociada a formaciones de matorral, prefiere las grandes manchas de jara pingosa. No obstante, también se la puede encontrar en brezales y montes mixtos.