

Curruca tomillera

Sylvia conspicillata



FENOLOGÍA

Todos los avistamientos se centran entre abril y septiembre.

DISTRIBUCIÓN

Sólo sabemos de su reproducción en el cerro del Guindo (La Carolina). Apenas hay datos de su migración por Sierra Morena, aunque pensamos que deben pasar aves por las cuatro provincias.

COMENTARIOS

Esta especie está asociada en la Península a áreas semidesérticas, marismas secas, campiñas y zonas de alta montaña, donde cría sobre todo en tomillares, saladares y otros matorrales bajos. No hemos encontrado datos previos de su reproducción en Sierra Morena hasta los obtenidos en las primaveras de 2010 y 2011.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	DD

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante rara.

POBLACIÓN

Es una de las aves más escasas de Sierra Morena, contando con un solo núcleo conocido (al menos 2 pp.).

HÁBITAT

Cumbres deforestadas con matorral ralo.