


## Estornino pinto

*Sturnus vulgaris*



### FENOLOGÍA

Su período principal de permanencia en nuestro territorio va de octubre a marzo.

### DISTRIBUCIÓN

Se puede encontrar en zonas propicias de toda la región, siendo por lo general siempre escaso y complicado de avistar.

### COMENTARIOS

Se infiltra en bandos del mucho más abundante estornino negro, al que es muy parecido en plumaje invernal.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
H-2	<b>SE-2</b>	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	<b>J-3</b>
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	<b>CO-8</b>	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	<b>SE-10</b>	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
<b>H-14</b>	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	<b>CO-15</b>	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Invernante.

### POBLACIÓN

Escaso.

### HÁBITAT

Cultivos en la campiña, y dehesas y pastizales ganaderos en zonas de sierra.