


## Garcilla bueyera

*Bubulcus ibis*



### FENOLOGÍA

Adquiere sus mayores números entre octubre y marzo, aunque se le ve todos los meses del año.

### DISTRIBUCIÓN

Se reparte de modo más o menos continuo por todo el territorio, aunque en gran parte de Córdoba y Jaén prácticamente queda relegada a las zonas meridionales de campiña.

### COMENTARIOS

Hemos detectado aves con plumaje nupcial en algunas garceras (embalse de José Torán, Salto de El Carpio, embalse de Aracena), pero sin que se haya constatado comportamiento reproductor; no obstante, no es descartable que pueda llegar a reproducirse en bajo número.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
H-2	<b>SE-2</b>	<b>CO-2</b>	J-2
<b>H-3</b>	SE-3	CO-3	<b>J-3</b>
H-4	<b>SE-4</b>	CO-4	<b>J-4</b>
<b>H-5</b>	SE-5	<b>CO-5</b>	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
<b>H-8</b>	SE-8	<b>CO-8</b>	J-8
<b>H-9</b>	<b>SE-9</b>	CO-9	J-9
<b>H-10</b>	<b>SE-10</b>	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	<b>CO-12</b>	J-12
<b>H-13</b>	<b>SE-13</b>	CO-13	<b>J-13</b>
<b>H-14</b>	<b>SE-14</b>	CO-14	J-14
H-15	<b>SE-15</b>	<b>CO-15</b>	J-15
<b>H-16</b>			
H-17			

### ESTATUS

Invernante, aunque en algunas zonas parece ser sedentaria.

### POBLACIÓN

Poco común en términos generales. Escasa en época estival.

### HÁBITAT

Áreas agrícolas, dehesas y pastizales con ganado, ríos y embalses. Forma dormideros invernales en pinares, riberas e incluso en parques urbanos (por ejemplo, en Cazalla de la Sierra).