


Herrerillo común

Parus caeruleus



FENOLOGÍA

Se le ve todo el año. Fuera de la época de cría se une a agrupaciones mixtas con otras especies de páridos, y parece que en invierno recibimos la llegada de herrerillos más norteños.

DISTRIBUCIÓN

Bien repartido por el conjunto de la cordillera. En época de cría es muy escaso en las zonas de campiña.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario e invernante.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Puebla casi cualquier tipo de formación forestal, si bien para criar prefiere bosques de arbolado maduro (dehesas, alcornocales, castañares, florestas mixtas, etc.).