


Lavandera boyera

Motacilla flava



FENOLOGÍA

El paso prenupcial tiene lugar en marzo-mayo, y el postnupcial esencialmente en agosto y septiembre. Entre dichas fases contamos con la presencia de aves reproductoras.

DISTRIBUCIÓN

Durante sus desplazamientos migratorios se puede ver en áreas propicias de cualquier comarca. Como reproductora se cibe al entorno agrícola de La Puebla de los Infantes en Sevilla, al valle del Guadalquivir en Hornachuelos y Montoro, y a los cultivos del sur de Andújar y Marmolejo.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante y estival.

POBLACIÓN

Escasa como migrante. Muy escasa como reproductora.

HÁBITAT

En migración frecuente pastizales de uso ganadero y cultivos. Los núcleos de cría están en zonas agrícolas de la campiña y el pie de la sierra.