

Martinete común

Nycticorax nycticorax



FENOLOGÍA

La mayor parte de las citas se dan entre abril y septiembre.

DISTRIBUCIÓN

El único lugar donde se ha comprobado la reproducción es en el río Guadalquivir en la presa de El Salto. Otras localidades donde se le detecta frecuentemente en época estival (aves divagantes) son el río Sillo, el azud del Esparragal y el río Viar, y el río Jándula por El Encinarejo y El Rincón. En paso puede aparecer por cualquier cauce.

COMENTARIOS

La mayor parte de avistamientos parece obedecer al patrón dispersivo y divagante de aves que forman parte de las colonias de Extremadura y Doñana, o bien a ejemplares no reproductores que se mueven entre humedales del sur peninsular. Esto explicaría que se le aviste en plena época estival en localidades en las que no anida.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	NT

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Migrante, con algunas aves reproductoras y otras divagantes.

POBLACIÓN

Muy escaso como reproductor (unas 10 pp.), y escaso como migrante y divagante.

HÁBITAT

Embalses y ríos. Anida en arbolado de ribera y eneales.