


## Papamoscas cerrojillo

*Ficedula hypoleuca*



### FENOLOGÍA

Los pasos se dan, sobre todo, en abril-mayo y de finales de agosto a finales de septiembre. Las aves estivales se ven dentro de ese rango de fechas.

### DISTRIBUCIÓN

La exigua población reproductora se asienta en robledales de Sierra Quintana, justo en el límite de Jaén con Ciudad Real (a unos 1.150 msnm), donde en la temporada de 2011 se vieron varios machos cantores y ejemplares con cebas; además, su reproducción no es descartable en dos pequeños enclaves de castañar de Despeñaperros a menor altitud (820 msnm), pues en ellos se han registrado machos cantores varias primaveras.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
<b>H-2</b>	SE-2	CO-2	<b>J-2</b>
<b>H-3</b>	<b>SE-3</b>	<b>CO-3</b>	<b>J-3</b>
<b>H-4</b>	<b>SE-4</b>	<b>CO-4</b>	<b>J-4</b>
<b>H-5</b>	<b>SE-5</b>	<b>CO-5</b>	<b>J-5</b>
<b>H-6</b>	<b>SE-6</b>	<b>CO-6</b>	<b>J-6</b>
<b>H-7</b>	<b>SE-7</b>	<b>CO-7</b>	<b>J-7</b>
<b>H-8</b>	<b>SE-8</b>	<b>CO-8</b>	<b>J-8</b>
<b>H-9</b>	<b>SE-9</b>	<b>CO-9</b>	<b>J-9</b>
<b>H-10</b>	SE-10	<b>CO-10</b>	<b>J-10</b>
<b>H-11</b>	<b>SE-11</b>	<b>CO-11</b>	<b>J-11</b>
<b>H-12</b>	SE-12	CO-12	<b>J-12</b>
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	<b>SE-15</b>	CO-15	J-15
<b>H-16</b>			
H-17			

### ESTATUS

Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Como migrante es poco común, variando bastante sus números interanualmente. Como reproductor es raro y localizado.

### HÁBITAT

Las aves reproductoras eligen melojares y rodales de viejos castaños rodeados de pinares. En paso se registra en cualquier tipo de bosque, y a veces también en áreas despejadas de vegetación.