


## Papamoscas gris

*Muscicapa striata*



### FENOLOGÍA

Se le puede registrar entre abril y noviembre.

### DISTRIBUCIÓN

Es una especie que cría de modo disperso y en bajo número en las cuatro provincias, siendo más numeroso en la mitad occidental. Aunque la mayor parte de sus efectivos están en las zonas de sierra, también conocemos su reproducción en sotos fluviales de la campiña. Hay algunos casos de nidificación dentro de cascos urbanos, tanto en casas como en elementos singulares como farolas.

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	<b>J-2</b>
H-3	SE-3	<b>CO-3</b>	J-3
<b>H-4</b>	SE-4	CO-4	J-4
<b>H-5</b>	SE-5	CO-5	J-5
<b>H-6</b>	<b>SE-6</b>	CO-6	J-6
H-7	<b>SE-7</b>	CO-7	J-7
<b>H-8</b>	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	<b>J-10</b>
<b>H-11</b>	SE-11	<b>CO-11</b>	J-11
<b>H-12</b>	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ESTATUS

Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Como reproductor es escaso, siendo poco común en el paso migratorio.

### HÁBITAT

Cría, sobre todo, en dehesas y alcornocales maduros, bosques y sotos de ribera con algunos árboles viejos (chopos, eucaliptos), castañares, parques urbanos y pinares, pudiendo hacerlo también en otras forestas relativamente abiertas, siempre que tengan árboles viejos con huecos para ubicar el nido. En paso es más flexible, e incluso ronda pseudoestepas y campos agrícolas.