


## Pardillo común

*Carduelis cannabina*



### FENOLOGÍA

Se ve todo el año. El sur ibérico, y por ende Sierra Morena, recibe invernantes entre octubre y marzo.

### DISTRIBUCIÓN

Aparece en toda la región.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Sedentario.

### POBLACIÓN

Común.

### HÁBITAT

De los presentes en nuestro territorio, es el fringilido más asociado a espacios abiertos, como pastizales, cultivos, prados en valles fluviales, cabezos con matorral ralo, ambientes rupícolas, etc. Esporádicamente se le avista en áreas forestales más apretadas.