

Perdiz roja

Alectoris rufa



FENOLOGÍA

Permanece en el territorio todo el año. Su celo se produce en enero-febrero, y las polladas se registran entre finales de abril y septiembre.

DISTRIBUCIÓN

Está bien repartida por toda Sierra Morena, siendo más numerosa en zonas de campiña y áreas de monte bajo de Córdoba, Sevilla y Jaén.

COMENTARIOS

Los serranos la consideran una especie cada vez más escasa. Es pieza de caza muy codiciada, que tiene incluso una considerable economía asociada en La Carolina y su entorno.

AMENAZAS

La contaminación genética producida por sueltas de perdices de granja es una amenaza poco visible pero, al parecer, importante en Sierra Morena, especialmente en la mitad occidental.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	DD	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentaria.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Monte mediterráneo y manchas de matorral. Ocasionalmente en dehesas y plantaciones forestales.