

Pico de coral

Estrilda astrild




CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			



FENOLOGÍA

Todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Mucho más frecuente y mejor repartido en Sierra de Aracena y Picos de Aroche que en el resto del territorio. En Sevilla lo hay al menos en tramos del río Viar, algunos embalses (azud del Esparragal, colas de José Torán, pantano de La Roncadera) y huertos junto a algunos pueblos. En Córdoba ocupa los márgenes del Guadalquivir y las desembocaduras de cauces menores en el mismo, así como tramos bajos del Bembézar y sus afluentes (La Rabilarga, Guadalora, etc.). En Jaén se cita en los sotos del Guadalquivir y en la parte baja del Jándula y el Rumbalar, así como en ríos y arroyos de la campiña (Guadiel, Salado de Arjona, etc.).

COMENTARIOS

Se trata de la única especie exótica de la que realmente pueda decirse que ha invadido y colonizado Sierra Morena. Las primeras citas son de los años 90, pero ha sido en la década 2000-2010 cuando se ha extendido, en un proceso de expansión que pensamos continúa hoy día.

ESTATUS

Sedentario.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Requiere de áreas con temperaturas suaves, y por ello suele elegir valles fluviales, vegas y campiñas. En ellos se asienta, rondando sotos ribereños arbustivos, eneales, huertos y algunas zonas de matorral.