


Piquituerto común

Loxia curvirostra



FENOLOGÍA

Se puede ver a lo largo de todo el año, si bien no nos atrevemos a asegurar que sea un ave sedentaria en los lugares donde se reproduce, debido a su tendencia a asentarse de modo temporal en distintas áreas en función de la disponibilidad de alimento.

DISTRIBUCIÓN

Es una de las especies más raras de la cordillera, con citas al menos desde 1995 y que probablemente ha colonizado el territorio tras las masivas plantaciones de pinos efectuadas a mediados del siglo XX. La mayor parte de sus efectivos se halla en Córdoba, donde hay datos antiguos de posible reproducción cerca de Cerro Muriano, y una población más numerosa y estable (al menos en los últimos años) en Montes Comunales de Adamuz. También hay observaciones en el entorno del embalse de Martín Gonzalo (Montoro). Cría, asimismo, en la Sierra de Andújar. No hay datos en Huelva ni en Sierra Morena Sevillana, si bien cerca del límite meridional de esta última comarca se reportó hace unos inviernos un bando invernal (embalse de La Minilla).

COMENTARIOS

El piquituerto puede criar en cualquier momento del año, dependiendo de la producción de piñones. De hecho, en Montes Comunales hemos registrado pollos jóvenes a finales del invierno en las dos últimas temporadas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Reproductor con movimientos de nomadeo.

POBLACIÓN

Raro.

HÁBITAT

Come piñones pequeños, de ahí que en Sierra Morena sólo aparezca en determinados pinares en los que hay rodales de pino carrasco *Pinus halepensis*.