


Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla



FENOLOGÍA

Las aves invernantes aparecen en noviembre y se quedan hasta marzoabril. En las áreas de cría se registran ejemplares todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Se reparte de modo irregular por la cordillera. Sus principales bastiones son los pinares del extremo oriental (Despeñaperros, Aldeaquemada) y las riberas, castañares, alcornocales y bosques mixtos de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En Sevilla es mucho más escaso, estando confinado a los bosques riparios de las riberas de Huéznar y Ciudadreja, mientras que en Córdoba es raro (aparece, al menos, en algunos pinares de umbría de Villaviciosa de Córdoba). En invierno está mucho mejor distribuido, avistándose en casi todo el territorio.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Reproductor aparentemente sedentario, invernante y migrante.

POBLACIÓN

Escaso como reproductor, y común en invierno.

HÁBITAT

Las áreas de reproducción son siempre bosques húmedos, como alisedas y otras riberas arboladas, castañares, robledales y zonas frescas en pinares. Los invernantes son mucho más eclécticos, apareciendo en casi cualquier superficie que tenga algo de árboles, e incluso en jarales y otras manchas de matorral.