


Ruiseñor bastardo

Cettia cetti



FENOLOGÍA

Se ve todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye por todo el territorio, aunque parece más numeroso en la mitad occidental.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario, probablemente con un modesto aporte de invernantes.

POBLACIÓN

Poco común.

HÁBITAT

Taxón asociado a bosques de ribera y sotos ribereños de matorral o vegetación palustre, aunque puntualmente aparece en umbrías frescas con densa vegetación arbustiva. Fuera de la época reproductora se muestra más flexible y llega a verse en linderos, manchas de monte, huertos, etc.