

## Ruiseñor común

*Luscinia megarhynchos*



### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS


Estival y migrante.

### POBLACIÓN

Común.

### HÁBITAT

Riberas arboladas y arbustivas, linderos y setos, umbrías de monte mediterráneo, masas forestales con sotobosque, bardales, e incluso jardines y parques urbanos. En general es una especie asociada a matorrales en ambientes frescos, evitando las solanas y las áreas especialmente secas.



### FENOLOGÍA

Llega a finales de marzo y se marcha en septiembre.

### DISTRIBUCIÓN

Todo el territorio.

### COMENTARIOS

Se considera una de las mejores aves canoras ibéricas, debido a su potente, variado y melódico canto, que emite también de noche en época de celo; sin embargo, ya avanzada la estación reproductora, sus vocalizaciones quedan reducidas a un peculiar reclamo parecido al croar de las ranas.