

Somormujo lavanco

Podiceps cristatus



FENOLOGÍA

Hay localidades donde sólo se ve en fechas de paso e invernada, y otras en las que permanece todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Aparece en lugares propicios de las cuatro provincias. Es más numeroso en el embalse de Aracena, donde sin embargo no se ha constatado su reproducción por el momento. Donde sí cría es en los embalses del Retortillo (12 pp.) y del Arenoso (mínimo de 47 pp.).

COMENTARIOS

Aunque veamos aves en época estival en algunos embalses, incluso realizando su bonito y llamativo cortejo, ello no implica que estén criando aquí; a la amplia permanencia temporal de la especie en nuestro territorio hay que sumarle la presencia de algunas aves –probablemente inmaduras que también pasan el verano, pero sin llegar a reproducirse.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Invernante, con algunas aves reproductoras y otras veraneantes.

POBLACIÓN

Poco común como invernante, siendo muy raro como reproductor.

HÁBITAT

Embalses de mediano y gran tamaño.