


## Tarabilla norteña

*Saxicola rubetra*



### FENOLOGÍA

En el paso prenupcial es muy escasa, siendo mucho más fácil verla en el postnupcial, especialmente en la segunda mitad del mes de septiembre.

### DISTRIBUCIÓN

Se le ve en toda Sierra Morena.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
<b>H-2</b>	<b>SE-2</b>	<b>CO-2</b>	J-2
H-3	SE-3	<b>CO-3</b>	<b>J-3</b>
H-4	<b>SE-4</b>	CO-4	J-4
H-5	SE-5	<b>CO-5</b>	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
<b>H-8</b>	SE-8	<b>CO-8</b>	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	<b>SE-10</b>	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
<b>H-13</b>	SE-13	CO-13	<b>J-13</b>
<b>H-14</b>	<b>SE-14</b>	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Migrante.

### POBLACIÓN

Poco común.

### HÁBITAT

Todo tipo de áreas abiertas, como pastizales, campiñas, dehesas abiertas, valles fluviales, etc.