


Torcecuello euroasiático

Jynx torquilla



FENOLOGÍA

El grueso se detecta entre marzo y septiembre, aunque cada vez se registran más citas invernales.

DISTRIBUCIÓN

Como reproductor resulta raro en la mitad oriental, siendo más frecuente en Huelva y Sevilla. En invierno hay avistamientos en todas las provincias.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	DD	NT

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante, con algunas aves invernantes.

POBLACIÓN

Escaso en términos generales. Más frecuente en los pasos.

HÁBITAT

Cría en bosques frescos, principalmente castañares, alcornocales y sotos de ribera, siempre que cuenten con claros o espacios abiertos en los que abundan las hormigas (que son su alimento). En migración es más flexible, pudiendo detectarse incluso en zonas de campiña. En invierno se avista casi exclusivamente en dehesas ganaderas.