


Tórtola europea

Streptopelia turtur



FENOLOGÍA

De principios de abril a finales de septiembre.

DISTRIBUCIÓN

Se reparte por toda Sierra Morena.

COMENTARIOS

Tras la reproducción suelen agruparse, y a veces se forman dormideros en sotos ribereños.

AMENAZAS

Especie en declive en la comarca y en toda Europa, muy afectada sobre todo por la intensificación agrícola (uso de herbicidas, destrucción de linderos y riberas, etc.). La tórtola es, probablemente, la única especie de ave gravemente perjudicada por la caza hoy en día en Sierra Morena, debido a la persistencia de la media veda –letal para los reproductores tardíos y las segundas puestas y al uso de comederos para abatirla.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	VU	VU

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Especie que prospera principalmente en áreas térmicas, como valles a baja altitud, cauces fluviales con soto de adelfas y tamujos, linderos y sotos en campiñas agrícolas, etc., aunque no desdeña del todo bosques más frescos y densos.