

Tórtola turca

Streptopelia decaocto



CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS


Sedentaria.

POBLACIÓN

Común.

HÁBITAT

Jardines, parques y calles arboladas, siempre dentro de pueblos. También en el entorno de cebaderos y comederos de ganado, corrales con abundancia de cerdos y ovejas, y otros ambientes pecuarios. Raramente la veremos en lugares no humanizados.



FENOLOGÍA

Todo el año.

DISTRIBUCIÓN

Se reparte por toda Sierra Morena, siendo más numerosa en áreas ganaderas de Huelva, Sevilla y el piedemonte jiennense.

COMENTARIOS

Se documentó su llegada a Aracena en 1994, y a Cazalla de la Sierra en el año 2000. Esta especie tiende a ser demonizada y a ser catalogada como un invasor; hay que recordar, no obstante, que no está demostrado que perjudique a la tórtola europea ni a las cosechas, y que es un colonizador que ha llegado a nuestros lares por sus propios medios, como otras especies que –sin embargo gozan de mucha mejor reputación, como el vencejo café o la golondrina dáurica.