


Vencejo cafre

Apus caffer



FENOLOGÍA

Se ve entre abril y octubre.

DISTRIBUCIÓN

Hay reproducción comprobada en las cuatro provincias, si bien en promedio está mejor distribuido en la zona oriental. Entre sus zonas de presencia se cuentan las Peña de Aroche, el valle del río Jarrama, entorno de Almonaster, valle de las Buervas y la rivera de Alcalaboba en Huelva; el Cerro del Hierro, el valle del Viar y el cañón del Guadalbacar en Sevilla; la Sierra de Hornachuelos y el valle del Guadalbarbo en Córdoba; o el valle del Yeguas, las minas de La Carolina, Los Órganos de Despeñaperros y la cascada de La Cimbarra en Jaén.

COMENTARIOS

Colonizador que llegó a la Península en 1962, con los primeros datos en nuestro territorio en el año 1975 (Hornachuelos). Cuando toma un nido de dáurica, coloca en la boca del mismo unas plumitas que nos recuerdan a un "estandarte de conquista".

AMENAZAS

Es una especie muy sensible a las molestias humanas, que abandona el nido si su tranquilidad es quebrantada. Conocemos casos de territorios abandonados por este motivo, sobre todo los ubicados en puentes accesibles.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	VU	VU

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Escaso (estimamos un mínimo de 25 pp.).

HÁBITAT

Esta especie aparece casi siempre en roquedos y en valles de ríos en los que haya puentes, con algunas parejas en minas. Necesita la presencia de golondrina dáurica, pues parasita nidos de ésta.