


Vencejo moro

Apus affinis



FENOLOGÍA

Permanece todo el año en su localidad de cría.

DISTRIBUCIÓN

De momento sólo puebla el cañón del Guadalbaccar, en Sierra Morena Sevillana.

COMENTARIOS

Esta es una de las especies ornitológicas más raras de Europa. Se trata de un pequeño vencejo habitual en núcleos urbanos de África y Oriente, que en la Península sólo tiene tres colonias costeras en Cádiz, siendo la de Sierra Morena Sevillana la única del interior conocida hasta la fecha. Las primeras citas aquí se remontan a 2006 (2 pp.), cuando incluso se anillaron adultos de esta especie junto con vencejos cañes; desde entonces vienen reproduciéndose entre una y tres parejas por temporada.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Sedentario.

POBLACIÓN

Muy raro (1-3 pp.)

HÁBITAT

Habita un cañón fluvial muy térmico, con empinadas laderas de matorral, cuevas y cortados rocosos de poca entidad, y donde también hay construcciones humanas (puentes y muro de presa).