


Vencejo pálido

Apus pallidus



FENOLOGÍA

Permanece entre nosotros más tiempo que el vencejo común, pues llegan a partir de febrero y algunos no se marchan hasta octubre.

DISTRIBUCIÓN

Hay parejas y colonias dispersas por todo el territorio, si bien es más abundante en los pueblos del valle del Guadalquivir (Hornachuelos, Montoro, Andújar, Villanueva de la Reina, Guarromán, Carboneros, Bailén). No conocemos ninguna localidad en la que no coincida con el vencejo común.

COMENTARIOS

La identificación del dúo de especies formado por el vencejo común y el pálido es una de las más complicadas de entre todas las aves ibéricas. De ahí la escasez de datos ciertos acerca de la distribución de *Apus pallidus*. Para separarlos se requieren avistamientos de calidad y, especialmente, la audición de sus cantos.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Escaso.

HÁBITAT

Al igual que su cercano pariente, tiene colonias en grietas de edificios en cascos urbanos.