


Vencejo real

Apus melba



FENOLOGÍA

Aunque su horquilla de permanencia en la Península va de febrero a principios de noviembre, la mayor parte de los vencejos reales rondan las colonias de Sierra Morena entre mediados de marzo y primeros de octubre.

DISTRIBUCIÓN

Ausente como reproductor en Huelva y extremadamente escaso en Sevilla (sólo hay 13 pp., en el Cerro del Hierro). En Córdoba hay colonias en roquedos y serrejones calizos del valle del Guadiato. En Jaén resulta más frecuente, con varias colonias repartida por las principales cuerdas montañosas del norte, siendo la más importante la de Los Órganos.

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			

ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Como reproductor es escaso, como migrante poco común.

HÁBITAT

Todas las colonias se hallan en cortados rocosos, sobre todo de cierta entidad. En paso se ven bandos en vuelo.