


## Verderón común

*Carduelis chloris*



### FENOLOGÍA

Se ve todo el año.

### DISTRIBUCIÓN

Repartido por áreas favorables de las cuatro provincias, siendo aparentemente más numeroso en las campiñas cercanas al Guadalquivir.

### CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	-	-

### ¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
<b>H-1</b>	<b>SE-1</b>	CO-1	J-1
H-2	<b>SE-2</b>	<b>CO-2</b>	J-2
<b>H-3</b>	SE-3	<b>CO-3</b>	<b>J-3</b>
H-4	<b>SE-4</b>	CO-4	<b>J-4</b>
<b>H-5</b>	SE-5	<b>CO-5</b>	J-5
H-6	SE-6	<b>CO-6</b>	J-6
H-7	SE-7	CO-7	<b>J-7</b>
H-8	<b>SE-8</b>	<b>CO-8</b>	J-8
<b>H-9</b>	SE-9	CO-9	J-9
<b>H-10</b>	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
<b>H-13</b>	<b>SE-13</b>	CO-13	<b>J-13</b>
<b>H-14</b>	SE-14	<b>CO-14</b>	J-14
H-15	SE-15	CO-15	<b>J-15</b>
H-16			
H-17			

### ESTATUS

Sedentario, con probable llegada de ejemplares foráneos en paso e invernada.

### POBLACIÓN

Poco común.

### HÁBITAT

Busca espacios abiertos con arbolado disperso, principalmente áreas de cultivo con linderos, huertos, pastizales, manchas de matorral, sotos fluviales, etc. También aparece en olivares, dehesas y otros bosques poco densos.